

ご使用に際してこの説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

## リゾチーム塩酸塩配合の総合かぜ薬

**フルダン®顆粒** 第②類医薬品

鼻水、くしゃみ、頭痛、せき、発熱に

## ⚠ 使用上の注意

## ☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

## 1. 次の人は服用しないでください

(1) 本剤又は本剤の成分、鶏卵によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

## 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)

## 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

(眠気等があらわれることがあります。)

## 4. 服用前後は飲酒しないでください

## 5. 長期連用しないでください

## 相談すること

## 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。

(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

(3) 授乳中の人。

(4) 高齢者。

(5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(6) 次の症状のある人。

高熱、排尿困難

(7) 次の診断を受けた人。

甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、線内障

## 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難
その他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (ステーキンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死融解症 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿泡)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。

裏面もよくご覧ください。

症状の名称	状 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらつとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
□のかわき、眠気

4.5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

### 効能・効果

かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒(発熱によるさむけ)、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

### 用法・用量

次の量を食後なるべく30分以内に水又は白湯で服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1包	3回
11歳以上15歳未満	2/3包	
7歳以上11歳未満	1/2包	
3歳以上7歳未満	1/3包	
3歳未満	服用しないでください	

### 《用法・用量に関連する注意》

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 用法・用量を厳守してください。

### 成分とはたらき

淡褐色の顆粒で次の成分を含んでいます。

成 分	3包(3.0g)中	はたらき
リゾチーム塩酸塩	60mg(力価)	のど・気管支などの粘膜の炎症をおさえ、たんの切れをよくし、たんを出しやすくします。
カンゾウエキス末 (原生葉換算量)	100mg (700mg)	
アセトアミノフェン	900mg	痛みを鎮め、熱をさげます。
クロルフェニラミン マレイン酸塩	7.5mg	抗ヒスタミン作用で鼻水、鼻づまり、くしゃみを抑えます。
dl-メチルエフェドリン 塩酸塩	60mg	気管支に作用し、たんを出しやすくなります。
チペビジンヒベンズ酸塩	75mg	せきを鎮めます。
無水カフェイン	75mg	解熱鎮痛作用を助けます。

添加物として、D-マンニトール、リン酸水素Ca、乳糖水和物、ヒドロキシプロピルセルロース、ケイヒを含有します。

### 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

### 消費者ご相談窓口

本剤をご使用になり、何かお気づきの点がございましたら下記まで  
ご連絡いただきます様お願い申し上げます。

株式会社廣昌堂 富山県射水市水戸田2841 ☎0766-54-1007  
受付時間：9時から17時まで（土、日、祝日を除く）

製造販売元 株式会社 廣昌堂 富山県射水市水戸田2841

NK・FB