

ご使用に際してこの説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

《複合胃腸薬》

胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、食べ過ぎ、胃弱

MIONM[®]

第2類医薬品

制酸剤、健胃生薬、消化剤配合



ミロンMの特徴

- 消化酵素ピロチンアスターゼ1000とプロザイムが消化を助け、胃腸の負担を軽くします。
- 健胃生薬成分が食べ過ぎ、飲み過ぎなどで弱った胃を元気にしてくれます。
- 制酸剤が出すぎた胃酸を中和し、胸やけなどの不快な症状を和らげます。
- 銅クロロフィリンナトリウムとカンゾウ末が荒れた胃粘膜を修復・保護します。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと


(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください
胃腸鎮痛鎮痙薬
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります。)



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 高齢者。
(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(5) 次の症状のある人。
排尿困難
(6) 次の診断を受けた人。
腎臓病、心臓病、緑内障
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください



関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
口のかわき、便秘、下痢
4. 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

その他の注意

母乳が出にくくなる場合があります。

裏面もよくご覧ください。

効能・効果

胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、胃部・腹部膨満感、もたれ（胃もたれ）、胃重、胸つかえ、げっぷ（おくび）、はきけ（むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心）、嘔吐、食べ過ぎ（過食）、飲み過ぎ（過飲）、胃痛、食欲不振（食欲減退）、消化不良、胃弱、消化促進

用法・用量

次の1回量を、1日3回、食前または食後に服用してください。

年齢	1回服用量	1日服用回数
大人（15才以上）	1包	3回
11才以上 15才未満	2/3包	
8才以上 11才未満	1/2包	
8才未満	服用しないでください	

用法・用量に関連する注意

- （1）定められた用法・用量を厳守してください。
- （2）小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量

ミロンMは、大人1日量3包（1包：1200mg）中に次の成分を含んでいます。

	成分	3包中		成分	3包中
制酸剤	炭酸水素ナトリウム	1200mg	利胆剤 健胃生薬	ウルソデオキシコール酸	20mg
	炭酸マグネシウム	500mg		ケイヒ末	320mg
	ロートエキス3倍散 （ロートエキス）	90mg 30mg		ウコン末	100mg
粘膜修復剤	カンゾウ末	150mg		ウイキョウ末	80mg
	銅クロロフィリンナトリウム	45mg		ゲンチアナ末	60mg
消化酵素剤	ジオチアスターゼ1000	60mg		ショウキョウ末	50mg
	プロザイム	20mg			


添加物として、乳糖水和物、バレイショデンブン、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースCa、D-マンニトール、*l*-メントール及びデキストリンを含有します。

成分に関連する注意

本剤の服用により便が緑色になることがありますが、配合されている銅クロロフィリンナトリウム（緑色）によるものであり、心配ありません。

保管及び取り扱い上の注意

- （1）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- （2）小児の手の届かない所に保管してください。
- （3）他の容器に入れ替えないでください。
（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- （4）1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- （5）使用期限（ケースに記載）を過ぎた製品は、服用しないでください。



問い合わせ先（お客様相談係）

電話番号：076-431-8863【テイカ製薬（株）】
受付時間：9時から17時まで（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

製造販売元

テイカ製薬株式会社
富山市荒川一丁目3番27号