ご使用に際してこの説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第３類医薬品

ビタミンC主薬製剤（錠剤）

ユーソフトC錠

しみ、日やけによる色素沈着の緩和に

特　徴　ビタミンC（アスコルビン酸）は、水溶性のビタミンで生理的・薬理的に重要なはたらきを有し、人では体内でつくることができないので、食品又は医薬品から摂取することが必要です。
ユーソフトC錠はビタミンCとビタミンCのナトリウム塩（L-アスコルビン酸ナトリウム）を配合した小型で服用しやすいビタミンC製剤です。

⚠ 使用上の注意

相談すること

１．服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

関係部位	症　　状
消　化　器	吐き気・嘔吐

２．服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください
下痢

３．１ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

〔効能・効果〕

１．次の諸症状の緩和
しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着
２．次の場合の出血予防
歯ぐきからの出血、鼻出血
「ただし、１及び２の症状について、１ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師にご相談ください。」
３．次の場合のビタミンCの補給
肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期

裏面もお読みください。

〔用法・用量〕

次の量を食後に水又は白湯で服用してください。

年　　齢	1 回 量	1 日服用回数
大人（15歳以上）	2～8錠	3回
7歳以上15歳未満	1～4錠	
7歳未満	服用しないこと	

《用法・用量に関連する注意》

(1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
(2)用法・用量を厳守してください。

〔成分・分量〕

淡紅色の錠剤で、次の成分を含みます。

成　　分	24錠中
アスコルビン酸（ビタミンC）	1,000mg
L-アスコルビン酸ナトリウム （ビタミンCのナトリウム塩）	1,124.9mg （アスコルビン酸として1,000mg）

添加物として、トウモロコシデンプン、乳糖水和物、D-マンニトール、サッカリンNa水和物、パントテン酸Ca、ポリリン酸Na、メタリン酸Na、ステアリン酸Mg、黄色5号、ヒドロキシプロピルセルロースを含有します。

《成分に関連する注意》

・本剤は、尿および大便の検査値に影響を及ぼすことがあります。尿および大便の検査を受ける場合には、ビタミンC製剤を服用していることを医師にお知らせください。

〔保管及び取扱い上の注意〕

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
(2)小児の手の届かない所に保管してください。
(3)他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
(4)一度開封した後は、品質保持の点から6ヵ月以内に服用してください。
(5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



[ビタミンCの知識]

①メラニンの生成を抑制して、しみや日やけによる色素沈着の緩和に効果があります。
②細胞と細胞をつなぐコラーゲン、ビタミンCがはたらいてコラーゲンの生成をたすけ、血管壁を丈夫にし、歯ぐきからの出血や鼻出血を防ぎます。
③ビタミンCは水に溶けやすく、蓄積される量が少ないビタミンです。

問い合わせ先（お客様相談係）
電話番号：076-431-8863［テイカ製薬(株)］
受付時間：9時から17時まで（土、日、祝日を除く）
副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

製造販売元
テイカ製薬株式会社
富山市荒川一丁目3番27号

NP**-**
A